

## EXERCICE I

Dans le plan ( $\mathcal{P}$ ), soit ABC un triangle isocèle tel que  $AB = AC$ , et P un point du segment  $[BC]$  distinct de B et de C. La parallèle menée par P à  $(AB)$  coupe  $(AC)$  en  $B'$ , et la parallèle menée par P à  $(AC)$  coupe  $(AB)$  en  $C'$ .

1°) Montrer que  $AC' = B'C$ .

2°) Justifier l'existence d'un unique antidéplacement  $f$  de ( $\mathcal{P}$ ) tel que:  $f(A) = C$  et  $f(C) = B'$ . Préciser la nature de cette transformation.

3°) a) Montrer que  $f(B) = A$ .

b) En déduire la décomposition canonique de  $f$ .

## EXERCICE II

Dans tout l'exercice,  $m$  et  $n$  désignent deux entiers naturels qui ont le même chiffre des unités dans l'écriture décimale.

1°) a) Montrer que  $m^5$  et  $n^5$  ont même chiffre des unités.

b) Pour chaque élément  $\hat{a}$  de  $\mathbf{Z} / 10\mathbf{Z}$ , donner la valeur de  $\hat{a}^5$ .

c) Montrer que si deux entiers naturels  $b$  et  $c$  sont tels que:  $b^5$  et  $c^5$  ont même chiffre des unités, alors  $b$  et  $c$  ont aussi même chiffre des unités (en écriture décimale).

2°) a) Montrer que  $m - n$  est divisible par 10.

b) Montrer que  $m^2 - n^2$  est divisible par 20.

3°) Déterminer tous les entiers naturels  $m$  et  $n$  vérifiant:  $m$  et  $n$  ont même chiffre des unités et  $m^2 - n^2 = 1940$ .

## PROBLEME

La fonction logarithme népérien est notée  $\ln$ .

## Partie A:

Soit la fonction :

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto x - \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right).$$

1°) a) Etudier la fonction  $f$  (ensemble de définition, limites, fonction dérivée, tableau de variation).

b) Montrer que la courbe représentative de  $f$  admet une branche parabolique de direction la droite d'équation:  $y = x$ .

c) Donner une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse zéro.

2°) On considère (E):  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 0$ .

a) Justifier le fait que cette équation a une unique solution non nulle. On note  $U_2$  la solution non nulle de (E).

b) Donner un encadrement de  $U_2$  par deux entiers consécutifs.

c) On donne le tableau suivant:

x	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
ln x	-2,996	-2,036	-1,897	-1,609	-1,386	-1,204	-1,050	-0,916	-0,798	-0,693

Donner une valeur approchée à 0,1 près de

$U_2$ .

3°) Tracer la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, I, J)$ . (Unité : 2 cm).

## Partie B

Soit  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On considère la fonction

$$f_n: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto x - (n-1) \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

1°) a) Montrer que, pour tout nombre réel  $t$  strictement supérieur à  $-1$ , on a:  $\ln(1+t) \leq t$ . En déduire que  $f_n(-1) \geq -\frac{1}{n}$ .

b) Donner le tableau de variation de  $f_n$ .

c) Montrer que:  $-\frac{1}{n} \leq f_n(-1) < 0$

d) Montrer qu'il existe un unique nombre réel  $U_n$  tel que:

$$U_n < -1 \quad \text{et} \quad f_n(U_n) = 0$$

2°) Soit  $g_n$  la fonction :

$$g_n: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f_n(x-1) - f_n(-x-1).$$

$g_n$

a) Déterminer l'ensemble de définition de

b) Montrer que  $g_n$  est impaire.

c) Donner le tableau de variation de  $g_n$ .

d) Montrer que pour  $n \geq 3$ , on a:  $f_n(-2) > 0$

e) En déduire que pour  $n \geq 2$ , on a:  $U_n > -2$ .

## Partie C

1°) Ecrire le développement limité d'ordre 2 en zéro de la fonction

$$[x \longmapsto \ln(1+x)].$$

2°) Soit  $\varepsilon$  une fonction numérique vérifiant

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon = 0.$$

Montrer que la suite  $(\varepsilon_n)_{(n \geq 2)}$  définie par :

$$\varepsilon_n = \varepsilon\left(\frac{U_n}{n}\right) \text{ converge vers zéro.}$$

3°) A l'aide des questions 1°) et 2°), exprimer  $U_n$  en fonction de  $n$  et d'une suite convergeant vers zéro.

4°) Montrer que la suite  $(U_n)$  est convergente et donner sa limite.